

Tokaji borvidéki növényvédelmi előrejelzés a június 12-18. közötti időszakra

Beköszöntött a nyári időjárás. Az elmúlt napokban napközben már 30°C feletti maximum hőmérsékletet is mérhettünk. A hőség a hét második felében tovább fokozódik, 35°C körüli értékekre kell felkészülnünk. Ez a meleg időjárás nehezíti a növényvédelmi kezelések elvégzését. A hatékonyság megőrzése érdekében a kezeléseket a kora hajnali, esti órákban végezzük el.

Fenológia

A szőlő virágzása még tart a borvidéken. Az ültetvények egy részénél már be is fejeződött. Azonban dülönként, fajtánként és művelésmódonként láthatunk eltéréseket. A zöldmunkákat számos helyen befejezték, egyes ültetvényekben most végzik őket. Az időben és jó minőségben elvégzett zöldmunkának köszönhetően szellősebb a lombzat, gyorsabban száradnak a levelek, illetve a növényvédő szerekkel is hatékonyabb védelmet tudunk elérni.



Furmint T85-ös tőke a Bakonyi dülőben 2019.06.11-én

Lisztharmat

A szőlő a virágzás és a fiatal bogyós időszakában rendkívül érzékeny a lisztharmatra. Az extrém meleg időjárás a lisztharmat számára nem optimális. Azonban a védekezést megelőző jelleggel folytassuk tovább kontakt (kén, meptildinokap) és felszívódó készítmény együttes alkalmazásával (fluxapiroxad, cyflufenamid, miklobutanil, quinoxifen, tebukonazol, spiroxamin). Kontakt készítmények használata esetén kerüljük azokat a napokat a kijuttatásra, mikor 25°C fok fölé emelkedik a hőmérséklet, a perzselés elkerülése érdekében. Ökológiai gazdálkodásban a kén készítményeket kiegészíthetjük narancsolaj és kálium-bikarbonát tartalmú szerekkel. Kezeletlen ültetvényben észlelhetőek a lisztharmat tünetei levélen.

Peronoszpóra

A peronoszpóra olajfoltjai már kezelt ültetvényekben is észlelhetők szórányosan. Bár a következő napok kifejezetten meleg időjárása nem kedvez a kórokozónak, a védekezést folytassuk tovább. Most még válasszunk felszívódó hatóanyagot is tartalmazó készítményt. A fiatal bogyók érzékenyek a fertőzésre (ciazofamid, metalaxil-M, foszforossav+ditianon, mandipropamid), a kombinált készítmények közül azokat válasszuk, amelyekben mankoceb, metiram vagy folpet található. Ökológiai gazdálkodásban a réz készítmények közül választhatunk a védekezéshez (rézoxiklorid, rézhidroxid).



Peronoszpóra tünete levélen

Botritisz

A meleg, nyárias időjárás nem kedvez a kórokozó számára. A virágzás időszakában, csapadékos körülmények között a fürtök érzékenyek a fertőzésre. Védekezésre érdemes folpet hatóanyagú szerek választani, amelyek védelmet biztosítanak a botritisz ellen is.

Feketerothadás

A feketerothadás levéltünetével néhány ültetvényben már találkoztunk. A szőlő esetében a fürtök legérzékenyebb időszaka kezdődik a teljes virágzástól. A bogyók másfél-két hónapig fogékonyak a fertőzésre. Védekezésre alkalmazható hatóanyagok: tebukonazol, miklobutanil, ditianon+foszforossav. Érdemes úgy megválasztani a növényvédőszereket, hogy lisztharmat vagy peronoszpóra ellen is védelmet nyújtsanak a feketerothadás mellett.

Amerikai szőlőkabóca

Az amerikai szőlőkabóca lárvái egyre nagyobb számban vannak jelen azon ültetvényekben, ahol észleltük őket. A védekezés a virágzást követően lesz időszerű. Most a legfontosabb teendő a megfigyelés, az ültetvények fertőzöttségének ismerete. Az ültetvények több pontján is végezzünk megfigyelést, mert a kabóca előrefordulása még egy homogén ültetvényben is egyenlőtlen oszlású lehet. A fehérszínű lárvákat az alsóbb levelek fonáki részén keressük. A leveleket óvatosan mozgassuk, mert a lárvák elugorhatnak. Védekezésre számos hatóanyag közül választhatunk (tau-fluvalinát, alfametrin, lambda-cihalotron, deltametrin, flupiradifuron). Ökológiai ültetvényekben a spinozad hatóanyag áll rendelkezésre.



Amerikai szőlőkabóca lárvája a levél fonáki részén

Amerikai lepkekabóca

Fiatal lárvák láthatóak a szőlő leveleinek fonákán. A védekezés jelenleg nem indokolt. A virágzást követően az amerikai szőlőkabóca elleni kezelések védelmet nyújtanak a lepkekabóca ellen is.

Tarka szőlőmoly

A kihelyezett csapdák nem fogják a tarka szőlőmoly egyedeit. A fürtök már nem észlelhetők a lárvák. Jelenleg a védekezés nem indokolt.

Szilva-takácsatka


Egyes ültetvényekben észlelhető a szilva-takácsatka kártétele. A károsítás nyomán a levelek sárgulása figyelhető meg. Mikroszkópos vizsgálat során az atkák is egyértelműen azonosíthatóak. Túlzott felszaporodását most kell megakadályozni. Súlyos károsításuk korai lombvesztéshez vezethet. A védekezésre speciális atkaölő készítményeket használjunk (abamektin, spiroidiklofen).



Szilva-takácsatka károsítása levélen

Kígyóaknás szőlómoly

A károsító kártétele kis számban látható egyes ültetvényekben. A védekezés nem indokolt, azonban a károsítás mértékét kövessük figyelemmel. Szükség esetén védekezünk csak.



Kígyóaknás szőlómoly kártétele

Vadkár

Elsősorban az erdő-közeli ültetvényekben találkozhatunk a vad károsításával. Védekezésre használhatunk állati zsiradékot tartalmazó készítményt, vagy perlit és fakátrány alapú vadriasztó szert, illetve emberi haját helyezhetünk még ki a területre.

Gyomszabályozás

Fordítsunk kellő figyelmet az ültetvények gyomszabályozására is. Kerüljük az ültetvények túlzott elgyomosodását. A gyomok jelentősebb felszaporodása párásabbá teszi az ültetvényt, ami a kórokozóknak kedvezőbb feltételeket teremt. A soraljak gyomirtására a soraljművelő gépeket vagy végső esetben glifozát hatóanyagot használhatunk. Azonban el kell kerülni, hogy a permetlé a szőlő zöld részeire kerüljön! Ezért fontos szerepe van az időben és jól elvégzett törzstisztításnak, ami történhet kézi vagy kémiai úton. Magról kelő gyomnövények ellen, azok néhány leveles állapotában kell védekezni. Élő gyomok ellen a magasabb dózist javasolt alkalmazni a növények intenzív növekedési fázisában. Apró szulák esetében virágzáskor kell kijuttatni a gyomirtó szert, mezei aszat ellen pedig tölevélrózsás állapotban. A glifozát felhasználása esetén úgy válasszuk meg a permetezés időpontját, hogy a kezelést követő 6 órán belül ne hulljon csapadék, hogy a hatóanyag maradéktalanul fel tudjon szívódni. A sorközök gyomszabályozására legjobb módszer a kaszálás.

A növényvédelmi kezelések elvégzése előtt fontos tájékozódni az időjárási viszonyokról. A várható csapadékról a radarképekről kaphatunk információt (<https://www.idokep.hu/radar>, vagy http://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/radar/). Abban az esetben, ha a permetezés közben elered az eső, az utolsó egy órában kezelt területeken célszerű újra elvégezni a növényvédelmi beavatkozást, mivel a kijuttatott permetlének körülbelül egy óra szükséges a megszáradáshoz.

Az elmúlt hét hőmérséklet és csapadék adatai:

2019.06.04-10.	átlaghőmérséklet (°C)	heti csapadék (mm)
Sárospatak Királyhegy	23,47	0
Sátoraljaújhely Szemszúró	22,97	0
Hercegkút Hosszúhegy	23,14	0,1
Tolcsva Nyakvágó	22,74	0
Erdőbénye Lócse	22,6	16,9
Vámosújfalú Rány	22,71	0,7
Olaszliszka Haraszt	23,2	6,2
Szegi Poklos	23,44	1,5
Tarcal Bakonyi	22,69	7,8
Tokaj Hétszőlő	23,11	14
Bodrogkeresztúr Dereszla	22,53	4,6
Mád Juharos	22,56	3,7
Mád Úrágya	23,31	6,6
Tállya Nyergesek	22,59	27,1
Abaújszántó Kassaváros	22,23	4,1

Várható időjárás 2019.06.12-18.

A hét második felében tovább melegszik az idő. 35°C körüli hőmérséklet értékekre kell számítani. Az előrejelzés alapján vasárnapig marad a kánikula. Hétfőn több fokkal visszaesik a hőmérséklet és pár mm csapadék várható.

Bodrogkisfaludon megnyitott a Községi Gazdabolt. Az előre jelzésben ajánlott hatóanyagok jelentős része a boltban megvásárolható!

