
Tokaji borvidéki növényvédelmi előrejelzés a július 29- augusztus 04. közötti időszakra

Az előző előrejelzés óta eltelt egy hétben gyakran alakultak ki záporok, zivatarok, azonban a lehullott mennyiségek tekintetében jelentős különbségek voltak a borvidék egyes részei között. Szombaton a csapadékkal több fokos lehülés is érkezett, de vasárnaptól újra melegszik az idő.

Szőlőmunkák

5-6. permetezésnél járnak a termelők. Sok helyen már a második csonkázás esedékes.

Fenológiai

A korai fajták zsendülése megkezdődött. A Furmint és a Hárslevelű esetében erre még várnunk kell.

Kórokozók

A kórokozók számára továbbra is kedvezőek a feltételek. Különösen igaz ez Szegi, Bodrogkeresztúr és Tarcál környékére, ahol a reggeli órákban párás körülmények uralkodnak. Ez pedig hosszabb levélnedvességet biztosít, ami kedvező a kórokozók számára. Az ültetvényekben akár mindhárom kórokozó tüneteivel találkozhatunk. A Furmint és a Hárslevelű bogyó a zsendülésig még érzékeny. A védekezést lisztharmat és feketerothadás ellen felszívódó készítménnyel folytassuk tovább (miklobutanil, tebukonazol), peronoszpóra ellen pedig rézzel (rézoxiklorid, rézhidroxid) védekezünk. Korai fajták esetében, ahol a zsendülés megkezdődött, ott a védekezést kén és réz kombinációjával végezzük. Ökológiai gazdálkodásban is ezzel a kombinációval tudunk védekezni. A zsendüléstől számíthatunk a szürkerothadás megjelenésére, különösen akkor, ha a bogyók megsérülnek (lisztharmat serves bogyó, molykártétel, mechanikai sérülés).



Olajfoltok a lombzat felső részén

Amerikai szőlőkabóca

A fogott egyedek száma nő. Ahol a fogási adatok elérik a védekezési küszöbértéket (4 egyed/lap/10 nap), ott az aktuális permetezési fordulónál juttassunk ki rovarölő készítmény a kabóca ellen (alfa-metrin, tau-fluvalinát, lambda-cihalotrin).



Amerikai szőlőkabóca imágója a sárga színcsapdán

Tarka szőlőmoly

A védekezés ott esedékes, ahol a nagy számban fogták a csapdák a tarka szőlőmoly egyedeit, illetve ahol fürt vizsgálatok nagyobb károsítást mutatnak. Az amerikai szőlőkabóca ellen javasolt hatóanyagok a tarka szőlőmoly ellen is alkalmazhatóak, így egyszerre tudunk védekezni a két károsító ellen.

Gyomszabályozás

Kerüljük el, hogy az ültetvényekben túlzott felszaporodjanak a gyomok, ezáltal párás körülményeket alakítsanak ki az sorok között. Mechanikai és kémiai módszerek közül választhatunk.

Az elmúlt hét hőmérséklet és csapadék adatai:

2020.07.21-27.	átlaghőmérséklet (°C)	heti csapadék (mm)
Sárospatak Királyhegy	22,1	47,5
Sátoraljaújhely Szemszúró	21,8	23,5
Hercegkút Hosszúhegy	22,5	17
Tolcsva Nyakvágó	21,5	3,3
Erdőbénye Lócse	21,4	23,8
Vámosújfalú Rány	-	-
Olaszliszka Haraszt	22,1	14,7
Szegi Poklos	21,9	8,5
Tarcal Bakonyi	21,3	16
Tokaj Hétszőlő	22	26,8
Bodrogkeresztúr Dereszla	21,3	16,4
Mád Juharos	21,6	8,8
Mád Úrágya	22,2	10,7
Tállya Nyergesek	21,5	5,5
Abaújszántó Kassaváros	21,2	37,3

Várható időjárás 07.29-08.04.

A következő egy hétben marad a meleg időjárás. Napközben 27-30°C-ra számíthatunk. Az esti órákban 13-17 fok várható. A csapadék csak a jövő hét elején várható. A szél szerdán és pénteken élénkül meg, akár 40 km/h-s szellőkések is lehetnek.

Pableczki Bence
Növényorvos