
Tokaji borvidéki növényvédelmi előrejelzés az augusztus 5-11. közötti időszakra

Július utolsó és augusztus első napjaiban napsütéses, meleg időjárásban volt részünk. Július 30-án és 31-én 30°C feletti hőmérsékleti értékeket mérhettünk napközben. Szombaton kisebb lehűlés következett be, de vasárnaptól új melegedett az idő. A hétvégén és a hét elején az éjszakák hűvösesek voltak, egyes helyeken (Erdőbénye, Tolcsva, Bodrogkeresztúr) 11-12°C-ot is mérhettünk. Az elmúlt egy hétben nem, vagy csak kis mennyiségű csapadék hullott a borvidéken. Tállyán rögzítettük a legnagyobb mennyiséget, 3 mm-t. Ezen túlmenően a kedd reggeli és a délelőtti órákban volt részünk kisebb esőben.

Szőlőmunkák

5-7. permetezésnél járnak a termelők. A második csonkázást végzik az ültetvényekben, illetve aktuális teendő a sorajlak és a sorközök gyomszabályozása. Ahol még nem történt meg a szellős lombzat kialakítása ott ezt mindenképp tegyék meg.

Fenológia

Megkezdődött a Furmint és a Hárslevelű zsendülése is.



Furmint fürt, Tolcsva, 2020.08.03.

Kórokozók

Lisztharmat

Számos ültetvényben erősödött a lisztharmat fertőzés mértéke. A fertőzési nyomás továbbra is magas. A zsendülő bogyók már nem érzékenyek a fertőzésre, viszont a fejletlenebb bogyók még fertőződhetnek. A védekezést kontakt (kén, meptildonokap) készítményekkel folytassuk. Az utolsó növényvédelmi kezelések elsődleges célja a lombzat védeleme.



Erős lisztharmat fertőzés

Peronoszpóra

Több ültetvényben is jelentős a lombzat felső részének a fertőzöttsége. A második csonkázás során e levelek nagyobb része eltávolításra kerül. A védekezésre réz készítményt válasszunk (rézoxiklorid, rézhidroxid).

Botritisz

A zsendüléstől számíthatunk a botritisz megjelenésére. 1-2 tünetes bogyóval, tömöttebb fürtű Furminton találoztunk, de csupán egy ültetvényben. A kórokozónak a párás, csapadékos körülmények kedveznek igazán. A bogyón kialakuló sérülések (lisztharmat sáros bogyó, molykártétel, mechanikai sérülés) utat nyithatnak fertőzésnek. Fontos, hogy megelőzzük e sérülések kialakulását, illetve tartsunk gyommentesen az ültetvényt, valamint alakítsunk ki szellős lombzatot a fürtzónában, a gyors felszáradás biztosítása érdekében. Védekezésre használható hatóanyagok: pirimetanil, fenhexamid, fludioxonil.



Botritisz tünete bogyón

Feketerothadás

A borvidéken komoly problémát okozott idén a feketerothadás. A zsendülés bekövetkeztével azonban a bogyók elvesztik fogékonyságukat. Az utolsó védekezés (tebukonazol, miklobutanil) ott lehet aktuális, ahol komolyabb a fertőzöttség mértéke, illetve jelentős a fejletlenebb bogyók aránya. Ahol sikeresen védekeztek, illetve nem jelentett gondot a feketerothadás ott nem indokolt a védekezés. A fertőzött, összeszáradt bogyók negatívan befolyásolják a borminőségét, így a szüret során figyelni kell majd, hogy ne kerüljenek bele a feldolgozandó termésbe.

Fakórothadás

A betegség elsősorban jégverés után jelentkezik. Védekezésre alkalmazható a folpet és a pirimetanil. A réz-készítmények a kórokozó ellen nem hatásosak. Jégeső után a gyorsaságé a főszerep. A kezelések a kár bekövetkezése után 12-18 órán belül hatásosak. Egy nap elteltével a védekezés hatástalan.

Fásbetegség

A fás betegségek tünetei több ültetvényben láthatóak. A fás betegség okozója többféle gomba is lehet, ezért a megjelenési formája is változatos. A fertőzött tőkét célszerű megjelölni. Ezen tőkét majd, a metszés előtt, az egészséges részig vissza kell vágni és sebkezelés alkalmazása szükséges. Az elhalt tőkét azonnal vágjuk ki és semmisítsük meg.

Kártevők

Amerikai szőlőkabóca

A csapdázott ültetvényekben jelentősen nőtt a fogók egyedeinek száma. Ahol a fogási adatok elérik a védekezési küszöbértéket (4 egyed/lap/10 nap), ott az aktuális permetezési fordulónál juttassunk ki rovarölő készítményt a kabóca ellen (alfametrin, tau-fluvalinát, lambda-cihalotrin).



Amerikai szőlőkabóca imágók a sárga színcsapdán

Tarka szőlómoly

A kihelyezett csapdák nem fognak új egyedeket. A védekezés ott esedékes, ahol a nagy számban fogták a csapdák a tarka szőlómoly egyedeit, illetve ahol fűrt vizsgálatok nagyobb károsítást mutatnak. Az amerikai szőlőkabóca ellen javasolt hatóanyagok a tarka szőlómoly ellen is alkalmazhatóak, így egyszerre tudunk védekezni a két károsító ellen.

Atka

A szilva-takácsatka károsítása néhány ültetvényben erősödött. A védekezésre az abamektin és spiroidiklofen hatóanyagok használhatóak.

Gyomszabályozás

Kerüljük el, hogy az ültetvényekben túlzottan felszaporodjanak a gyomok, ezáltal párás körülményeket alakítsanak ki az sorok között. Mechanikai és kémiai módszerek közül választhatunk. A soralkak vegyszeres gyomszabályozása esetén glifozát hatóanyag használható, kijuttatáskor ügyeljünk, hogy a szőlő zöld részeire nem jusson a permetléből.

Az elmúlt hét hőmérséklet és csapadék adatai:

2020.07.28-08.03.	átlaghőmérséklet (°C)	heti csapadék (mm)
Sárospatak Királyhegy	23,2	0
Sátoraljaújhely Szemszúró	23,1	0
Hercegkút Hosszúhegy	23,6	1,4
Tolcsva Nyakvágó	22,7	0,1
Erdőbénye Lócse	22,9	2
Vámosújfalú Rány	-	-

Olaszliszka Haraszt	23,6	0,5
Szegi Poklos	23,6	0,4
Tarcal Bakonyi	23	0
Tokaj Hétszőlő	23,7	0
Bodrogkeresztúr Dereszla	22,5	0
Mád Juharos	23	1,8
Mád Úrágya	24,1	0,4
Tállya Nyergesek	23,2	3
Abaújszántó Kassaváros	22,8	1,9

Várható időjárás 08.05-11.

A hét eleji melegedést követően szerdán néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. De így 27°C várható napközben. Csütörtöktől ismét beköszönt a kánikula, a hét második felében 30-33°C-ot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. Az esténként 18-22°C között alakul majd a hőmérséklet. Kedd este, szerda hajnalban várható csapadék (6 mm). A szél szerdán erősödhet meg, 40 km/h-t meghaladó szellőkésekre van kilátás.

Pableczki Bence
Növényorvos