

Próbaszüret 2018. augusztus 6.
Tokaji Kutatóintézet

Arról már mindenki tud, –akár van szőlője, kár nem- hogy az idén korai szüret várható. Talán csak az nem tudatosult a hírfogyasztókban, hogy nem egyszerűen „korai”, hiszen ezt az utóbbi években mindig hallhatta, hanem extrém módon korai! A sokéves átlaghoz képest egy hónappal van előrébb a szőlő fejlettsége, és a valaha feljegyzett legkorábbi éréssel állunk szemben. A rövidebb vegetációs időszak kevesebb növényvédelmi igénnyel is járt, ami jelentős megtakarítást jelent a gazdák számára. A korai szüret azonban felvet egy lényeges problémát! Vajon milyen melegben kell a szüretet megszervezni? Ha szüretkor túl meleg van, akkor az a leszedett szőlőszemekben káros kémiai folyamatokat indíthat el. Ez pedig a bor minőségét rontja, a bor hibás illatú és ízű lesz. Nagyon lényeges ezért, hogy csak korán reggel legyen szőlőszedés, és a termés mihamarabb hűvös helyre kerüljön be. A forró napokon napközbeni szüret nagyon káros következményekkel jár!

Egyelőre a muskotály és a furmint 7575-ös klónját vizsgáltuk csak. Érik a sárgamuskotály, olyannyira, hogy már a korai szüretet tervezik több helyen.

	cukor (g/l)		MM		sav (g/l)		pH	
	júl.30.	aug.6	júl.30.	aug.6	júl.30.	aug.6	júl.30.	aug.6
Tarcal, Szarvas-dűlő	180,5	205,50	17,1	19,10	9,38	7,61	3	3,26
Tállya, Pipiske-dűlő	136,5	171,00	13,5	16,30	15,27	10,60	3,09	3,10
Tarcal, Bakonyi-dűlő	178	200,00	16,9	18,60	8,5	8,82	3,03	3,07
Bodrogolaszi, Pajzos-dűlő,	149,5	193,50	14,6	18,10	11,15	8,97	2,94	3,12
Tállya, Görbe-dűlő	131	156,00	13	15,10	12,47	9,33		3,10
Bekecs, Nagy-hegy		181		17,15		8,44		3,13

A sárgamuskotály cukorfoka 15,1 és 19,1 magyar mustfok között változó. Az előző évekkel összehasonlítottuk a szőlő cukorfokát és azt tapasztaltuk, hogy az előző években a cukrosodás ilyen fokát jóval később értük el. Sőt az előző hetihez képest a gyors érés eredményeként még korábbinak tűnik az idei érettségi állapot.

	július 30.	aug.06.
	Hány nappal korábbi az előző évekhez képest?	
Tarcal, Szarvas-dűlő	10-30	16-22
Tállya, Pipiske-dűlő	15-32	20-23
Tarcal, Bakonyi-dűlő	24-34	22-35
Bodrogolaszi, Pajzos-dűlő,	15-22	21
Tállya, Görbe-dűlő* 2017-hez képest	10	8

A savtartalom jelentősen csökkent az előző hetihez képest.

Mintát vettünk a legkorábbi furmint klón, a 75/75-ös ültetvényén is. Lényeges változást nem mértünk.

	cukor (g/l)		MM		sav (g/l)		pH	
	júl.30.	aug.6	júl.30.	aug.6	júl.30.	aug.6	júl.30.	aug.6
Tarcal, Bakonyi-dűlő, furmint 75/75	178	177,5	16,9	16,85	13,38	9,67	2,84	2,91

A mintavétel módszere:

mennyisége: 10 fört

vizsgált paraméter: cukor és sav tartalom, valamint pH

förtök kiválasztása: Egy kiválasztott sorban Az 1. Oszloptól balra eső 1.fört, a 2. oszloptól balra eső 2. fört, a 3.oszloptól balra eső 3.förtstb. a 10. förtig. Összesen 10 fört.

módszer: A förtök préselésre kerülnek, majd a lebegő tartalom leülepedése után történik a mérés. A Brix fokot mérő digitális refraktométerrel cukor tartalom, laboratóriumban cukor, sav és pH mérést végzünk